


# *Centaurea raphanina* Sm.

- **Οικογένεια:** Asteraceae
- **Συνώνυμα:** –
- **Κοινή Ονομασία:** –
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**  
[http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm\\_dataportal/taxon/b9d4db09-376b-4ecc-b5cc-ad1e36458e8b](http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b9d4db09-376b-4ecc-b5cc-ad1e36458e8b)
- **Διάρκεια ζωής:** πολυετές
- **Ύψος:** 0- 5
- **Άνθη:** Ταξιανθίες, ροδόχρωμες ή ιώδεις, συνήθως 2 έως 4 στο κέντρο, περιβάλλονται από βράκτια που φέρουν τριχοειδείς απολήξεις στις άκρες τους και ακίδες στην κορυφή
- **Φύλλα:** Τα φύλλα σε ροζέτα, επιμήκη-λογχοειδή, βαθιά και ακανόνιστα λοβωτά, με σκούρο πράσινο γυαλιστερό χρώμα
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Μάρτιος-Ιούλιος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Νέκταρ, Γύρη



*Centaurea raphanina* (Φωτ.:Αικατερίνη Γούλα)



Γυρεόκοκκος *Centaurea raphanina* (Φωτ.: αρχείο ΕΛΜΕΠΑ)