

Scabiosa atropurpurea L.

- **Οικογένεια:** Dipsacaceae
- **Συνώνυμα:** *Sixalix atropurpurea* (L.) Greuter & Burdet, *Scabiosa atropurpurea* subsp. *chaniotica* (Rech f.) Rech. f., *Scabiosa maritima* L., *Scabiosa atropurpurea* subsp. *maritima* (L.) Arcang., *Sixalix atropurpurea* subsp. *maritima* (L.) Greuter & Burdet
- **Κοινή Ονομασία:** Σκαμπιόζα
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4a342587-7dd6-418c-acc2-a08bea8d23cb#distribution
- **Διάρκεια Ζωής:** Διετές
- **Ύψος:** 20-60εκ.
- **Άνθη:** Κεφάλιο με διάμετρο 5 εκ., ανθίδια με πέντε λοβούς, ιώδη, ρόδινα ή λευκά, τα περιφερειακά πολύ μεγαλύτερα
- **Φύλλα:** Αντίθετα, φύλλα βάσης ωοειδή έως σπατουλοειδή, ακέραια ή με εγκολπώσεις και μακρύ μίσχο. Φύλλα στο ανώτερο μέρος του φυτού πτεροσχιδή
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Απρίλιος-Σεπτέμβριος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Γύρη, Νέκταρ



Scabiosa atropurpurea (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)



Γυρεόκοκκος *Scabiosa atropurpurea* (Φωτ.: Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)