

Smilax aspera L.

- **Οικογένεια:** Smilacaceae
- **Συνώνυμα:** *Smilax mauritanica*, *Smilax nigra*, *Smilax aspera* subsp. *mauritanica*
- **Κοινή Ονομασία:** Αρκουδόβατος
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b9d4db09-376b-4ecc-b5cc-ad1e36458e8b
- **Διάρκεια ζωής:** πολυετές
- **Ύψος:** 100- 400
- **Άνθη:** Ακτινόμορφα, αρωματικά άνθη, λευκό-ρόδινου χρώματος, σε μασχαλιαίους κορύμβους.
- **Φύλλα:** Έμμισχα, σκληρά, γυαλιστερά, δερματώδη, καρδιόσχημα, με οδοντωτό και αγκαθωτό περιθώριο, διαμέτρου 8-10 εκ. με 7-9 παράλληλες νευρώσεις. Στην βάση των μίσχων εκ πτύσσονται 2 έλικες που βοηθούν την αναρρίχηση του φυτού.
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Αύγουστος-Νοέμβριος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Νέκταρ, Γύρη



Smilax aspera (Φωτ.:Αικατερίνη Γούλα)



Γυρεόκοκκος *Smilax aspera* (Φωτ.: αρχείο ΕΛΜΕΠΑ)