


# *Vicia villosa* Roth

- **Οικογένεια:** Fabaceae
- **Συνώνυμα:** –
- **Κοινή Ονομασία:** Αγριόβικος, Καβαλλαριά
- **Γεωγραφική** **Εξάπλωση:**  
[https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm\\_dataportal/taxon/36c0d3da-014b-444a-b7d3-e7bd1f0e0cdd#distribution](https://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/36c0d3da-014b-444a-b7d3-e7bd1f0e0cdd#distribution)
- **Διάρκεια ζωής:** Μονοετές
- **Ύψος:** 30 εκ- 2μ.
- **Άνθη:** Ταξιανθία με 8-10 άνθη, λευκά με περιάνθιο κυανό-ιώδες ριγωτό
- **Φύλλα:** Σύνητα, κατ'εναλλαγή, με 8-12 μικρά ημιστρόγγυλα φυλλάρια και έλικα στην άκρη
- **Διάρκεια Ανθοφορίας:** Μάρτιος-Ιούνιος
- **Φυτική/Ανθική Παροχή:** Γύρη, Νέκταρ



*Vicia villosa* (Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)



Γυρεόκοκκος *Vicia villosa* (Αρχείο Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Α.Π.Θ.)