

Lachnus roboris

- **Οικογένεια:** Lachnidae
- **Φυτό – ξενιστής (κοινή ονομασία και γένος):** Δρυς (*Quercus* spp.)
- **Περιοχές εμφάνισης στην Ελλάδα:** Παρνεόστι Δράμας – οροσειρά Ροδόπης (Ανατ.Μακεδονία), Δάσος Φολόης Ηλείας (Κεντρ.Πελοπόννησος)
- **Βιολογικό στάδιο εντόμου, παραγωγικό σε μελίτωμα:** όλα τα βιολογικά στάδια
- **Περίοδος μελιτοέκκρισης:** Ιούνιος – Αύγουστος
- **Σχόλια – Άλλες Πληροφορίες:** Έχει εντοπιστεί στο είδος *Quercus frainetto* (syn. *Q. conferta*). Οι αφίδες είναι η κυρίαρχη πηγή μελιτώματος και παραγωγής μελιού βελανιδιάς. Η πληθυσμιακή του πυκνότητα επηρεάζεται ευνοϊκά από ήπιο χειμώνα, ψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και μειωμένες βροχές την Άνοιξη. Κείμενο-φωτογραφίες: Σοφία Γούναρη, ΕΛΓΟ / Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)



Lachnus roboris (Σ.Γούναρη)