

# Parthenolecanium rufulum

- **Οικογένεια:** Coccidae
- **Φυτό – ξενιστής (κοινή ονομασία και γένος):** Δρυς (*Quercus* spp.)
- **Περιοχές εμφάνισης στην Ελλάδα:** Γρεβενά (οροσειρά Κεντρ.Πίνδου), όρος Πάικο (Πέλλα), Έδεσσα (Όρος Σωτήρας), Νευροκόπι Δράμας, όρος Κερκίνη (Μπέλλες) (Κιλκίς), όρος Μαυροβούνι Πηλίου (Μαγνησίας), δάσος Φολόης Ηλείας (Κεντρ.Πελοπόννησος)
- **Βιολογικό στάδιο εντόμου, παραγωγικό σε μελίτωμα:** Ακμαίο θήλυ
- **Περίοδος μελιτοέκκρισης:** Ιούνιος – Ιούλιος
- **Σχόλια – Άλλες Πληροφορίες:** Στα Γρεβενά (οροσειρά Κεντρ.Πίνδου), έχει εντοπιστεί στο είδος *Quercus cerris*. Στο όρος Πάικο (Πέλλα), έχει εντοπιστεί στο είδος *Quercus petraea* spp. *petraea* (syn. *Q. sessiliflora*). Στην Έδεσσα, Νευροκόπι Δράμας, όρος Κερκίνη (Μπέλλες), όρος Μαυροβούνι Πηλίου και στο δάσος Φολόης Ηλείας, έχει εμφανιστεί στο είδος *Quercus frainetto* (syn. *Q. conferta*). Η πληθυσμιακή πυκνότητα του εντόμου είναι μικρή. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη συλλογή μελιού. Κείμενο-φωτογραφίες: Σοφία Γούναρη, ΕΛΓΟ / Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)



Ακμαίο θήλυ *Parthenolecanium rufulum* (Σ.Γούναρη)

Εμβληματική δράση. Οι δρόμοι της μέλισσας