Tuberculoides annulatus

- **Οικογένεια**: Diaspididae
- **Φυτό – ξενιστής (κοινή ονομασία και γένος)**: Δρυς (*Quercus* spp.)
- **Περιοχές εμφάνισης στην Ελλάδα**: Γρεβενά (οροσειρά Κεντρ.Πίνδου), όρος Πάικο (Πέλλα), Νευροκόπι Δράμας, όρος Κερκίνη (Μπέλλες) (Κιλκίς), δάσος Φολόης Ηλείας (Κεντρ.Πελοπόννησος)
- **Βιολογικό στάδιο εντόμου, παραγωγικό σε μελίτωμα**: Ακμαίο θήλυ
- **Περίοδος μελιτοέκκρισης**: Ιούλιος – Αύγουστος
- **Σχόλια – Άλλες Πληροφορίες**: Στα Γρεβενά (οροσειρά Κεντρ.Πίνδου), έχει εντοπιστεί στο είδος *Quercus cerris*. Στο όρος Πάικο (Πέλλα) έχει εντοπιστεί στο είδος *Quercus petraea* spp. *petraea* (syn. *Q. sessiliflora*). Στο Νευροκόπι Δράμας, στο όρος Κερκίνη (Μπέλλες) (Κιλκίς) και στο δάσος Φολόης Ηλείας (Κεντρ.Πελοπόννησο), έχει εντοπιστεί στο είδος *Quercus frainetto* (syn. *Q.conferta*). Κείμενο-φωτογραφίες: Σοφία Γούναρη, ΕΛΓΟ / Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)



Tuberculoides annulatus (Σ.Γούναρη)